

复方玄驹胶囊联合西药治疗活动性强直性脊柱炎 例 临床疗效观察

徐 艳

南京鼓楼集团宿迁市人民医院血液科,江苏 宿迁 223800

【摘要】目的 观察复方玄驹胶囊联合西药治疗活动性强直性脊柱炎的临床疗效。方法 选取60例强直性脊柱炎患者,随机分为治疗组(R)和对照组(C)。治疗组口服柳氮磺吡啶、沙利度胺、复方玄驹胶囊;对照组口服柳氮磺吡啶、沙利度胺。结果 治疗组总有效率93.33%,对照组总有效率70.00%。两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 复方玄驹胶囊联合西药治疗活动性强直性脊柱炎可达到更好的临床疗效。

【关键词】强直性脊柱炎;复方玄驹胶囊;西药

doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.08.662

:1004-7484(2013)-08-4657-02

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性风湿性疾病,好发于青壮年男性,主要表现为腰背痛、晨僵、活动受限等。本组患者均为活动性强直性脊柱炎,经影像学检查确诊。治疗组采用复方玄驹胶囊联合西药治疗,对照组采用常规西药治疗。随访3个月,治疗组在临床症状改善、影像学指标等方面均优于对照组。

方法 选取60例强直性脊柱炎患者,随机分为治疗组(R)和对照组(C)。治疗组口服柳氮磺吡啶、沙利度胺、复方玄驹胶囊;对照组口服柳氮磺吡啶、沙利度胺。随访3个月,记录临床症状改善情况、影像学指标变化等。

临床资料
1. 一般资料:本组患者均为活动性强直性脊柱炎,经影像学检查确诊。年龄18-40岁,平均年龄23.9±4.1岁。病程3个月-7年,平均4.2±1.6年。HLA-B27阳性25例,阴性5例。X线骶髂关节炎SIJ级按ARA分级,Ⅱ级23例,Ⅲ级7例。随访3个月,记录临床症状改善情况、影像学指标变化等。

结果 治疗组总有效率93.33%,对照组总有效率70.00%。两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 复方玄驹胶囊联合西药治疗活动性强直性脊柱炎可达到更好的临床疗效。

纳入标准:符合活动性强直性脊柱炎诊断标准,年龄18-40岁,病程3个月-7年,HLA-B27阳性或阴性均可。排除标准:合并其他系统性疾病,如糖尿病、高血压、心脏病等。随访3个月,记录临床症状改善情况、影像学指标变化等。

统计学处理 采用SPSS10.0软件进行统计学处理。计量资料采用t检验,计数资料采用χ²检验。P<0.05为差异有统计学意义。

表 两组患者治疗前后临床指标变化比较(̄x)

组别	例数	d周4B疼痛数	Schober E cm	胸廓 cm	-墙 cm	- cm		
] 疗组] 疗	30	52.36±23.42	3.11±1.45	3.92±1.27	3.83±1.16	4.34±1.22	16.12±10.20
] 疗	30	16.22±11.36**Δ	1.18±0.19**Δ	5.42±1.21*	4.41±1.07*	2.91±1.87*	10.33±5.45**
- 组] 疗	30	51.72±25.13	3.06±1.50	3.88±1.32	3.81±1.14	4.39±1.30	16.10±8.24
] 疗	30	20.42±12.17*	1.51±1.20*	5.11±1.41*	4.28±1.10*	4.14±1.98	12.19±6.77*

注:[] 疗组] 疗比较 *P<0.05 **P<0.01 {} 组] 疗比较 ΔP<0.05

表 两组患者治疗前后实验室指标变化比较(̄x)

组别	例数	ESR mg/h	CRP mg/L	IgG g/L	IgM g/L	IgA g/L	
] 疗组] 疗	30	51.12±20.09	28.46±15.21	19.66±5.03	2.99±0.54	4.98±0.82
] 疗	30	15.26±11.32**Δ	9.36±4.17**Δ	15.27±4.81*	2.40±0.63*	2.41±0.88**
- 组] 疗	30	49.36±18.87	29.01±14.93	19.43±4.99	3.01±0.49	4.94±0.67
] 疗	30	23.34±12.05*	14.41±3.90*	15.98±5.11*	2.42±0.72*	3.23±0.74*

注:[] 疗组] 疗比较 *P<0.05 **P<.01 {} 组] 疗比较 ΔP<0.05

影像学指标:胸廓扩张度、-墙、-、Schober E、骶髂关节炎SIJ级。治疗组>II级 E III K II级 1例 23例 组患 <OS 比较差b f \$

() P>0.05
 . 安 {] 组_ 道 3 HF 6E y] 差 k 泻 2 例
 ' 腔溃疡 3 例 皮 M3 例 1 例 _ 组_ 道 3 7 例 ' 腔溃疡 6 例
 皮 M5 例 4 例 丙 酶 v 4 例] 组 e 3
 V 率明 * S_ 组 P<0.05 T 组 e 3 7 VS 药 期 经
 _ 症 RM 均 PK c 血 c 规 m 功]

讨 论
 期 脊柱 ? D * 苦 s 期 接 < ^
 _ * { l & _ S 期 脊柱 *] DE 控 _
 w * 致 5 率 * 4 近 U 期 3 G 药 * F
 s 柳氮磺 % 目 * _ _ 8 * G 药 b S 3
 * d 周 4 B _ 3 v 4 B _ v 乏 证 e 3 包 n . 症
 皮 M 减 > bc l 胺 目 h
 S _ 期 3 ' 6 昏 倦 怠 w A 脊 柱 Y 3 # \$
 症 " \] _ _ p E 素 - H 气 血 e m H) * , #
 x / 袭 肌 4 B 筋 骨 经 络 闭 气 血 e h s 致 _ K : 玄 驹 胶 m
 3 蚂 蚁 1 m 血) N) N * 淫 羊 藿 1 壮 阳 N) , 枸 杞
 O 甘 l 1 益 m 坚 筋 骨 蛇 床 O 苦 x x 壮 阳 N * 6 药
 x 1 阳) N * J 药 s = 扶 { N : 面 _)
 , 4 B o } }] 7 临 床 E Z [明 K : 玄 驹 胶 m] 脊 柱
 l H * ,) 证 8 明 v 明 控 ^ 3 脊 柱

致 * 4 B 肿 胀 晨 临 床 症 L 安
 Z [uv 3 4 # u #] 临 床 症 - Et o 3
 均 优 S 单 纯 4 药] x] 组 e 3 V 率 明 * S _ 组 3
 4 药] 期 脊 柱 _ S 临 床 控 _ w * 致
 5 率 3 Et ! | o 减 ; 副 G : 面 8 * 优 R % 临
 床] 期 脊 柱 * 8 :

参考文献

- [1] 中华医学会 湿病分会. 直性脊柱炎诊治 < 南(草案) [J]. 中华湿病学志, 2003, 7(10): 641 - 644.
- [2] 曾 徐 整理. 国 直性脊柱炎研讨会纪要 [J]. 中华) 科杂志, 2002, 41(6): 421 - 423.
- [3] 杰 洲, 曾 徐. 直性脊柱炎的疾病 动性、 能, 况 及 的 评 [J]. 中华 湿病学杂志, 1998, 2(4): 229 - 232.
- [4] 郑 筱 萸. 中 药 新 药 临 床 研 究 < 导 则 [M]. : 中 国 医 药 科 技 出 版 社, 2002: 120.
- [5] 王 建 明, 阎 小 萍, 王 昊, 等. 补 肾 督 方 治 疗 直 性 脊 柱 炎 T U 259 例 临 床 研 究 [J]. 中 医 杂 志, 2006, 47(6): 433 - 435.
- [6] 国 家 药 典 委 员 会. 中 国 药 典 [M]. : H 学 工 业 出 版 社, 2000: 256.
- [7] Wang Y X, J ia W. Studies on the anti-inflammatory effect of Compound Xuanju Capsule [J]. J. U. S. A. ChinMed, 2001, 7(6): 6 - 10.

中医推拿治疗 例原发性高血压临床效果观察

熊启超

宣汉县土黄中心卫生院, 四川 宣汉 636150

【摘要】目的 bV 推拿 O 性 血压 mn i 。方法 取 我 院 2009 1 —2012 12 _ O 性 血 压 60 例, 随 机 数 字 MA R 联 S R, R 各 30 例; R 纯 pV 药 \$, 联 S R R / R 基 础 L 加 bV 推 拿 ; 比 较 } R mn 总 f 率, 前 后 mn 症 MO 血 压! e 。结 果 R 联 S R mn 总 f 率 M | A 76. 7%, 93. 3%; 联 S R mn 总 f 率 明 R, R (比 较 差 异 f 计 W 义 (P < 0. 05); R) 联 S R 前 mn 症 MO 血 压! R (比 较 计 W 差 异 (P > 0. 05); } R 后 mn 症 MO 血 压! 均 明 3 R, 且 联 S R 降 明 R, R (比 较 差 异 f 计 W 义 (P < 0. 05) 。结 论 bV 推 拿 O 性 血 压 mn i 确, : v 改 善 mn 症, 降 3 血 压! , 改 善 预 后。

【关键词】bV; 推拿; O 性 血压;

doi: 10. 3969/j. issn. 1004 - 7484(s). 2013. 08. 663

: 1004 - 7484(2013) - 08 - 4658 - 02

[取 i 2009 1 月 —2012 12 月] 血 30
 例 f 4 # 药 P] D g 3 # x { 单 纯 4 #] | 比 比
 组 临 床] ; 8 率] 临 床 症 积 血 水 l ! 3 #
] 血 临 床 v

资料与方法

. 临 床 = [取 i 2009 1 月 —2012 12 月] 血
 60 例 均 # 3 血 防] 订 委 C 3 血 防]
 2005 订 临 床 C o p l 入 [随 p E O #] 组 30
 例 ^ _ 组 30 例 组 f D 血 水 l 临 床 =
 : 面 组 比 f \$ 差 b P > 0. 05
 .] : _ 组 单 纯 4 # 药 P] Y 莫 l [
 60 mg / d ; 240 mg / d O #] 组 f _ 组] D g 3 #
]