

# 复方玄驹胶囊治疗不孕不育临床疗效观察

崔 P, 伍 Q8

(Wo + 妇幼9? O, \* + 茂R 525400)

摘要:目的:观察复方玄驹胶囊对不孕不育患者的临床疗效。方法:选取我院2012年3月—2013年8月收治的140例不孕不育患者为研究对象,其中70例患者采用复方玄驹胶囊治疗,与同期采用醋酸泼尼松龙治疗的70例患者进行疗效对比,现报道如下。

关键词:不孕不育;肾虚;疗效对比

中图分类号:R256.56 文献标识码:A 文章编号:1673-2197(2014)06-0128-01

复方玄驹胶囊是国家中药保护品种之一,同时含有中药成分和西药成分,其组成药物有玄驹、淫羊藿、蛇床子和枸杞子等,具有补肾益精的功效。现代医学认为,不孕不育是由肾虚、精子少等造成的<sup>[1]</sup>。笔者为了进一步了解复方玄驹胶囊治疗不孕不育的疗效,现选取我院2012年3月—2013年8月收治的140例不孕不育患者为研究对象,其中70例患者采用复方玄驹胶囊治疗,与同期采用醋酸泼尼松龙治疗的70例患者进行疗效对比,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 临床资料

选取我院2012年3月—2013年8月收治的140例不孕不育患者为研究对象。140例患者均为男性,年龄23~44岁,平均年龄(27±3.4)岁,不育年限为1~7年。患者的临床症状为腰膝酸软或疼痛、性欲减退、面色微黄、小便频数或余沥不尽以及畏寒肢冷等。所有患者经临床诊断均符合《中药新药临床研究指导原则》的中医证候诊断标准,同时排除合并心脑血管、肝等造血系统疾病者。将所有患者随机均分为两组,每组70例,两组患者的年龄、临床表现等一般资料比较差异无统计学意义( $P>0.05$ ),具有可比性。

### 1.2 治疗方法

治疗组患者口服复方玄驹胶囊治疗,3次/天,3粒/次,以30天为1个疗程,共服用3个疗程。对照组口服醋酸泼尼松龙治疗,2次/天,5mg/次。两组患者均同时接受生活指导,主要包括戒除烟酒等不良嗜好以及排卵期禁止同房等。治疗3个疗程后对两组患者的治疗效果进行对比分析,判断复方玄驹胶囊的治疗效果<sup>[2]</sup>。

### 1.3 疗效标准

参照《不孕不育治疗学》、《计划生育技术》拟定疗效标

准。①显效:治疗后精子密度 $>20 \times 10^9/L$ ,或配偶受孕;②有效:治疗后精子密度增加 $10 \times 10^9/L$ 以上,临床症状改善;③无效:治疗后精子密度未见变化或变化甚微。

### 1.4 统计学分析

采用SPSS12.0软件对本实验数据进行统计学分析,其中计量资料比较采用 $t$ 检验,计数资料比较采用卡方检验,以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 两组患者治疗效果比较

治疗组70例患者中,显效39例,有效28例,无效3例,总有效率为95.7%;对照组70例患者中,显效20例,有效42例,无效8例,总有效率为88.6%。两组的总有效率比较差异显著,具有统计学意义( $P<0.05$ ),如表1所示。

表1 两组临床疗效比较 [n(%)]

组别	例数(n)	显效	有效	无效	总有效率(%)
治疗组	70	39(55.7)	28(40)	3(4.3)	95.7
对照组	70	20(28.6)	42(60)	8(11.4)	88.6

### 2.2 治疗组用药前后精液生化分析指标变化情况

采用复方玄驹胶囊治疗后,治疗组患者精液的果糖含量与治疗前比较差异无统计学意义( $P>0.05$ ); $\alpha$ -中性糖苷酶含量与用药前比较差异有统计学意义( $P<0.05$ ),如表2所示。

表2 治疗组用药前后精液生化分析指标变化 ( $\bar{x} \pm s$ )

项目	用药前	用药后	
		4周	12周
果糖含量 ( $\mu\text{mol/mL}$ )	18.02±12.14	16.29±5.34	20.24±10.12
$\alpha$ -中性糖苷酶 (U/mL)	35.53±14.21	39.12±14.35	43.21±18.53

收稿日期:2013-10-22

作者简介:崔P(1977-),男,硕士,主治医师,从事不孕不育临床工作。E-mail: cwp@163.com

# 兰索拉唑和奥美拉唑为基础的三联疗法 根治幽门螺杆菌临床疗效观察

苑红

(N圳C石岩<]) O,\* + N圳 518000)

摘要:目的:( ) \_\_e 兰! 拉唑q 奥R拉唑wp 础J c 联y K 根. 幽k 螺杆菌J > Oy Q. 方法: 2j } ~ 66! t Bw 幽k 螺杆菌C染J st wst ; J, \_\_ 2j l } K, N; 奥R拉唑} 33! , . y, l w 奥R拉唑、克拉霉素、阿莫] \$c O, l 联f ; 兰! 拉唑} 33! , . y, l w 兰! 拉唑、克拉霉素、阿莫] \$c O, l 联f ; ' 两} st J c O / 失时) 、3Qk、幽k 螺杆菌阴Sk 9V ^ k. 结果: 兰! 拉唑} st c O / 失时) ( C ( 奥R拉唑} %, P 1、4、7、28 Qc O / 失k l a Z C Q \* 5, 具 3noRj Z ( 1 < 0.05); e 兰! 拉唑wp 础J c 联y K; 幽k 螺杆菌抑. r \_ D, . | kW, V ^ k l . Hme 奥R拉唑wp 础J c 联y K. 结论: e 兰! 拉唑wp 础J c 联y K Z. y 幽k 螺杆菌C染u Z 3 ( Cy Q; 幽k 螺杆菌3 ( DJ 抑. r \_ , CQF # V ^ " , Hm 奥R拉唑c 联y K, , 得 > OT \* i \_ .

关键词: 奥R拉唑; 兰! 拉唑; 幽k 螺杆菌; c 联y K

中图分类号: R578.1

文献标识码: A

文章编号: 1673-2197(2014)06-0129-02

幽门螺杆菌(Hp)为导致胃及十二指肠溃疡的主要致病菌。近年来,胃及十二指肠溃疡的发病率逐年上升,复发率高,不易治愈<sup>[1]</sup>。在该病的治疗中,不仅要及时治愈溃疡,更应防止溃疡复发。质子泵抑制剂作为常规用药,在抑制胃酸方面效果显著。单独采用质子泵抑制剂治疗复发率高,病痛的反复折磨严重影响患者的生活质量<sup>[2]</sup>。本次研究比较在奥美拉唑或兰索拉唑的基础上联合阿莫西林、克拉霉素的两种三联疗法的临床疗效,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选择 2012—2013 年本社区内被明确诊断为 Hp 感染的

66 例患者为研究对象,采用随机分组法,其中奥美拉唑组 33 例,男 20 例,女 13 例,年龄为 25~59 岁,平均年龄为 (44.3±4.23)岁,采用以奥美拉唑为基础的三联疗法治疗;兰索拉唑组 33 例,其中男 21 例,女 12 例,年龄 26~58 岁,平均年龄为 (43.8±4.9)岁,采用以兰索拉唑为基础的三联疗法治疗。两组患者的性别、疾病、年龄等一般资料比较差异无统计学意义 (P > 0.05),具有可比性。

### 1.2 方法

奥美拉唑组采用的药物为奥美拉唑(四川科伦药业股份有限公司,H20120401),口服,40mg/天,1 天 2 次;兰索拉

等,值得临床推广应用。

## 参考文献:

- [1] 刘永杰,黄宇烽,邵永,等. 复方玄驹胶囊改善精液质量的临床观察[J]. 中华男科学杂志,2007(4):364-365.
- [2] 蔡健,邓哲献,蒋海波. 复方玄驹胶囊治疗勃起功能障碍的疗效观察[J]. 中华男科学杂志,2006,12(6):568-569.
- [3] 杨毅,何文桂,吴德锋,等. 复方玄驹胶囊治疗少弱精子症 79 例[J]. 浙江中医杂志,2010,45(5):345.
- [4] 金灿,毛金观. 复方玄驹胶囊治疗少弱精子症 33 例临床效果评价[J]. 海峡药学,2009,21(3):118-119.

(z { | } :: ; <)

## 3 讨论

随着医疗技术的不断发展,治疗勃起功能障碍症的方法越来越多,如药物治疗、传统的针灸治疗法、行为治疗以及心理疗法,这些治疗方法都有一定的效果。中医和西医都有各自的优势,但只采取其中一种治疗方案效果不甚明显,医生通常会采取中西医结合的治疗方法。复方玄驹胶囊治疗不孕不育效果满意<sup>[3]</sup>,常用于综合治疗。

复方玄驹胶囊由玄驹、淫羊藿、蛇床子和枸杞等中药配制而成,是国家中药保护品种之一。该药疗效稳定持久、安全、无毒副作用,标本兼治。玄驹含有 50 多种人体必需的营养物质,其中有 30 多种氨基酸,31 种微量元素,锌、磷、铁的含量最多<sup>[4]</sup>。应用复方玄驹胶囊治疗治愈了很多男性不育患者,此外其还可以治疗女性月经不调、不孕、异常妊娠

收稿日期:2013-11-28

作者简介: 苑红(1975—),o,\* + [ N圳C石岩<]) OG. ) 9.st uvw/p} Qpq.