

关研究[J]. 河北医学, 2013, 6(19): 801-805.

[6] 霍奇帆, 王丽美, 吕黄伟. 右美托咪啶对全麻非心脏手术患者术后早期认知功能障碍影响的 Meta 分析[J]. 中国循证医学杂志, 2014, 10(14): 1225-1233.

[7] 魏智慧, 赵欣, 高建华, 等. 亚甲蓝肋间神经阻滞联合地佐辛胸科术后镇痛的效果[J]. 西南国防医药, 2014, 12(24): 1350-1352.

[8] 郭燕芬, 冯顺华, 韩超, 等. 全麻复合硬膜外阻滞对老年非心脏手术患者术后认知功能障碍的影响[J]. 江苏医药, 2014, 40(23): 2925-2926.

[9] 肖桂梅. 吗啡可来定术后硬膜外自控镇痛的临床研究[J]. 医学临床研究, 2008, 25(12): 2228-2230.

[10] 唐正国, 常业恬. 曲马多用于剖宫产术后静脉自控镇痛的临床效果评价[J]. 医学临床研究, 2008, 25(11): 1975-1977.

[11] Falzone E, Hoffmann C, Keita H. Postoperative analgesia in elderly patients[J]. Drugs Aging, 2013, 30(2): 81-90.

[12] Yie JC, Yang JT, Wu CY, et al. Patient-controlled analgesia (PCA) following video-assisted thorascopic lobectomy: comparison of epidural PCA and intravenous PCA [J]. Acta Anaesthesiol Taiwan, 2012, 50(3): 92-95.

(收稿日期: 2015-12-12 修回日期: 2016-02-15)

• 临床探讨 •

复方玄驹胶囊治疗卵巢功能低下性不孕症疗效分析

韦彩素, 蓝燕, 李建湘, 班婷

(广西壮族自治区河池市人民医院妇产科 547000)

摘要:目的 观察复方玄驹胶囊治疗肾虚型卵巢功能低下性不孕的疗效。方法 将 78 例肾虚型卵巢功能低下性不孕症患者按照年龄分为 3 组, 低年龄组(18~30 岁)、中年组(>30~40 岁)、高年龄组(>40~50 岁), 每组各 26 例。在月经第 3 天开始服复方玄驹胶囊, 并给予心理疏导辅助治疗。服用 3 个疗程后, 观察各年龄组卵泡生成激素(FSH)、黄体生成激素(LH)、FSH/LH、雌二醇(E2)及宫颈黏液评分, 随访 2 年, 观察妊娠率及不良反应。结果 各年龄组中医证候均有改善, 差异有统计学意义($P < 0.05$)。各年龄组 FSH、LH、FSH/LH、E2 水平治疗后均较治疗前降低, 同组治疗前、后比较差异有统计学意义($P < 0.05$), 治疗后高年龄组和低年龄组 FSH 比较差异无统计学意义($P > 0.05$), 治疗后 E2 水平稳定在正常范围。结论 复方玄驹胶囊

后比较采用配对 t 检验,组间比较采用成组 t 检验;不符合正态分布的数据及计数资料比较采用非参数检验或 χ^2 检验,多组有序分类资料比较采用 Ridit 分析。以 $P < 0.05$ 为差异有

2.4 受孕率比较 随访2年78例患者受孕率为30.76%,其中低年龄组受孕率为61.50%,中年龄组受孕率46.15%,两组比较差异有统计学意义($\chi^2 = 5.62, P < 0.05$);高年龄组受孕

志, 2004, 20(3): 136-137.

[3] 中华医学会. 临床诊疗指南(妇产科学分册)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 118.

[4] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京: 南京大学出版社, 2008: 76

[5] 赵铭峰, 王聪, 冯少林, 等. 从肾论治排卵功能障碍性不孕症的临床研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2008, 10(12): 40-42.

[6] 陈春晓. 卵巢储备功能下降中医证候特征及内分泌特征 • 临床探讨 •

的研究[J]. 广州中医药大学学报, 2010, 10(6): 68-78.

[7] 谢小青, 王晓敏, 徐鹰, 等. 新稀宝配合克罗米芬治疗排卵功能障碍的临床疗效观察[J]. 生殖与避孕, 2010, 30(5): 358-359.

[8] 司秀真. 中西医结合治疗肾阳虚型不孕症 63 例[J]. 河南中医, 2012, 32(7): 891-892.

(收稿日期: 2015-12-21 修回日期: 2016-02-24)

综合护理干预对 2 型糖尿病患者血糖血脂水平及心脑血管事件的影响

景良洪, 曾艳丽, 宋凤平

(重庆市人民医院三院院区内分泌科 400014)

摘要:目的 探讨综合护理干预对 2 型糖尿病患者血糖、血脂水平及心脑血管事件的影响。方法 选取重庆市人民医院三院院区 2011 年 3 月至 2012 年 7 月收治的 144 例确诊为 2 型糖尿病的患者, 按数字表随机分配法分为综合干预组和对照组各 72 例, 对照组患者实施糖尿病患者常规护理, 干预组患者给予综合护理干预, 所有患者随访到 2015 年 7 月, 对比护理前、后两组患者血糖、血脂水平及两组患者心脑血管事件发生情况。结果 (1) 干预组患者护理后空腹血糖、糖化血红蛋白、胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇及体质量指数水平分别为 (5.91 ± 3.42) mmol/L、 $(6.14 \pm 0.98)\%$ 、 (3.75 ± 1.35) mmol/L、 (2.01 ± 0.54) mmol/L、 (24.9 ± 2.7) kg/m², 与护理前的 (6.87 ± 4.25) mmol/L、 $(7.27 \pm 1.36)\%$ 、 (4.55 ± 1.41) mmol/L、 (2.65 ± 0.89) mmol/L、 (26.9 ± 3.8) kg/m² 比较明显下降, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 而且与对照组护理后差异也有统计学意义 ($P < 0.05$)。 (2) 干预组总心血管事件发生 6 例, 对照组发生 13 例, 对比差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 其中干预组心脑血管死亡 2 例, 对照组心脑血管死亡 7